

Žádanka o vyšetření samoplátce - Peptest

verze 0125

Razítko, podpis indikujícího lékaře:

Odběrová místnost:
Palackého třída 436
Pardubice I - Zelené předměstí
530 02
odbery@interimun.cz
tel: 735 115 845**Laboratoř:**
Kavanova 438
Pardubice 17 - Rosice
533 51
interimun@interimun.cz
tel: 466 644 000

IČP:

Odbornost:

Bližší informace k odběrům na www.interimun.cz***Povinné položky*****Rodné číslo/č. pojištění:*****Jméno a příjmení:**

Kód diagnózy:

***Kontakt na samoplátce:**

email (pro zaslání faktury a výsledku):

Pokud nemáte email, uveďte poštovní adresu:

telefon:

Primární vzorek: X sliny

Datum a čas odběru vzorku:**Podpis samoplátce:**Požadované vyšetření: Peptest

Vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění.

Informaci o aktuální ceně a obědnání testu naleznete na stránkách e-shopu: vysetreni.interimun.cz/peptest/. Výsledky zašleme po obdržení platby na účet. Pokud je na žádance uvedeno razítko indikujícího lékaře, výsledky zašleme i lékaři.**Žádanka o vyšetření samoplátce - Peptest**

verze 0125

Razítko, podpis indikujícího lékaře:

Odběrová místnost:
Palackého třída 436
Pardubice I - Zelené předměstí
530 02
odbery@interimun.cz
tel: 735 115 845**Laboratoř:**
Kavanova 438
Pardubice 17 - Rosice
533 51
interimun@interimun.cz
tel: 466 644 000

IČP:

Odbornost:

Bližší informace k odběrům na www.interimun.cz***Povinné položky*****Rodné číslo/č. pojištění:*****Jméno a příjmení:**

Kód diagnózy:

***Kontakt na samoplátce:**

email (pro zaslání faktury a výsledku):

Pokud nemáte email, uveďte poštovní adresu:

telefon:

Primární vzorek: X sliny

Datum a čas odběru vzorku:**Podpis samoplátce:**Požadované vyšetření: Peptest

Vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění.

Informaci o aktuální ceně a obědnání testu naleznete na stránkách e-shopu: vysetreni.interimun.cz/peptest/. Výsledky zašleme po obdržení platby na účet. Pokud je na žádance uvedeno razítko indikujícího lékaře, výsledky zašleme i lékaři.

Pokyny k odběru vzorku slin pro Peptest

Odběr se provádí do speciální k tomu určené zkumavky s roztokem kyseliny citronové. Zkumavku si vyzvedněte v odběrové místnosti nebo u lékaře, který Vám vyšetření doporučil.

Odběr slin proved'te ráno na lačno ihned po probuzení. Před odběrem nejzte, nepijte, nekuřte a neprovádějte ústní hygienu. Odběr neprovádějte při krvácejících nebo zánětlivých afekcích v ústech.


Další varianta odběru je v období, kdy pociťujete příznaky refluxu, tedy silný kašel, pálení žáhy apod.

48 hodin před odběrem: Neužívejte léky s obsahem alginátu (např. Gaviscon, Gastrotuss), antacida, nepijte zásaditou / alkalickou vodu / minerálku.

24 hodin před odběrem: Pro úspěšný odběr potřebného množství slin je doporučeno pít dostatek tekutin.

Odběr provádějte ve vzpřímené poloze:

1. Odkošlete si
2. Vyplivněte sliny (bez hlenu) do zkumavky s roztokem kyseliny citronové.
3. Opakujte, dokud nebude v odběrové zkumavce 1 ml vzorku. Vzorek by měl sahat těsně pod rysku na spodní části samolepky na zkumavce. Zkumavku v žádném případě neplňte nad úroveň rysky.
4. Našroubujte víčko na zkumavku. Zkumavku dobře protřepejte, aby došlo k promíchání vzorku s činidlem ve zkumavce.
5. Na zkumavku napište datum a čas odběru. Zkumavku se vzorkem a žádanku doručte co nejdříve od odběru do laboratoře, nebo po domluvě lékaři. Vzorek je do doručení do laboratoře nutné skladovat v chladničce při 2-8°C.



INTERIMUN s.r.o., Kavanova 438, 533 51 Pardubice 17 – Rosice, tel.+420 466 644 000, e-mail: interimun@interimun.cz, www.interimun.cz

Pokyny k odběru vzorku slin pro Peptest

Odběr se provádí do speciální k tomu určené zkumavky s roztokem kyseliny citronové. Zkumavku si vyzvedněte v odběrové místnosti nebo u lékaře, který Vám vyšetření doporučil.

Odběr slin proved'te ráno na lačno ihned po probuzení. Před odběrem nejzte, nepijte, nekuřte a neprovádějte ústní hygienu. Odběr neprovádějte při krvácejících nebo zánětlivých afekcích v ústech.

Další varianta odběru je v období, kdy pociťujete příznaky refluxu, tedy silný kašel, pálení žáhy apod.

48 hodin před odběrem: Neužívejte léky s obsahem alginátu (např. Gaviscon, Gastrotuss), antacida, nepijte zásaditou / alkalickou vodu / minerálku.

24 hodin před odběrem: Pro úspěšný odběr potřebného množství slin je doporučeno pít dostatek tekutin.

Odběr provádějte ve vzpřímené poloze:

1. Odkošlete si
2. Vyplivněte sliny (bez hlenu) do zkumavky s roztokem kyseliny citronové.
3. Opakujte, dokud nebude v odběrové zkumavce 1 ml vzorku. Vzorek by měl sahat těsně pod rysku na spodní části samolepky na zkumavce. Zkumavku v žádném případě neplňte nad úroveň rysky.
4. Našroubujte víčko na zkumavku. Zkumavku dobře protřepejte, aby došlo k promíchání vzorku s činidlem ve zkumavce.
5. Na zkumavku napište datum a čas odběru. Zkumavku se vzorkem a žádanku doručte co nejdříve od odběru do laboratoře, nebo po domluvě lékaři. Vzorek je do doručení do laboratoře nutné skladovat v chladničce při 2-8°C.

